

問1

自発覚醒トライアル(Spontaneous Awakening Trial:SAT)の実施方法に含まれないものはどれか。



- ① 鎮静薬中止、漸減
- ② 鎮痛薬中止、漸減
- ③ 鎮痛薬は変更しない
- ④ 30分～4時間の観察

プレテスト問題

問2

「不安で絶えずそわそわしている、しかし動きは攻撃的でも活発でもない」状態は鎮静スケール(Richmond agitation-sedation scale:RASS)上、いくつかのスコアになるか。



- ① 4
- ② 3
- ③ 2
- ④ 1

ポストテスト問題

問2

「呼びかけに開眼し10秒未満のアイコンタクトで応答する」状態は鎮静スケール(Richmond agitation-sedation scale:RASS)上、いくつかのスコアになるか。



① -4

② -3

③ -2

④ -1

問3

自発呼吸トライアル(Spontaneous Breathing Trial: SBT)の開始**安全**基準に含まれない項目はどれか。

① 血液ガス分析による PO_2 の値が80mmHg以上

② 血行動態の安定

③ 呼吸性アシドーシスがない($pH > 7.25$)

④ シーソー呼吸がない

動脈血液ガス分析をルーチンで行うべきかどうかについては、現時点で明確にはなっていない。呼吸性アシドーシスを把握することのみを対象としている。



問4

自発呼吸トライアル(Spontaneous Breathing Trial: SBT)の成功基準に相応しくない項目はどれか。

① 呼吸数 < 36回 / min

呼吸数 < 30回 / min

- ② 開始前と比べて明らかな低下がない
(例えば $SpO_2 \geq 94\%$ 、 $PaO_2 \geq 70\text{mmHg}$)
- ③ 心拍数 < 140bpm、新たな不整脈や心筋虚血の徴候を認めない
- ④ 急激な血圧上昇を認めない



問5

自発呼吸トライアル(Spontaneous Breathing Trial: SBT)の成功率はおよそ何%か



① 40%

② 55%

③ 65%

④ 80%



お疲れさまでした

**問題2だけプレテスト
とポストテストの内容
が変わっています**

