

PADガイドライン

**プレ／ポストテスト  
解答**

PADガイドライン プレ/ポストテスト 解答③④

1.人工呼吸器管理下で、自分で痛みを訴えることができない患者に適した痛みの評価法について、正しいものを全て選んでください。

- × ① RASS 鎮静・不穏の評価
- × ② NRS 痛みの評価、訴えることができない
- ③ CPOT 設問の通り
- ④ BPS 設問の通り

## PADガイドライン プレ/ポストテスト 解答③

2.PADガイドラインで推奨されていない鎮静薬を選んでください。

- ① フェンタニル (フェンタネスト®)
- ② デクスメデトミジン (プレセデックス®)
- ③ ミダゾラム (ドルミカム®)
- ④ プロポフォール (ディプリバン®)

人工呼吸管理中の成人患者に鎮静薬を使用する場合には、ベンゾジアゼピン系薬よりも非ベンゾジアゼピン系鎮静薬を優先的に使用することを提案する (+2C)

※ミダゾラムは、ベンゾジアゼピン系鎮静薬

3.次の問題から間違っているものを選んでください。

- ①成人ICU患者は浅い鎮静深度で管理すべきである
- ②人工呼吸管理中の成人患者は、  
「鎮痛を優先に行う鎮静法」を用いるべきである
- ③せん妄はICU患者の予後を増悪し、ICU入室  
期間や入院期間を延長させ、ICU退室後も続く、  
認知機能障害に関連する
- ④CAM-ICUは、看護師の主観によらずに評価できる  
せん妄のスクリーニングツールである

## PADガイドライン プレ/ポストテスト 解答③

4.次の問題から正しいものを選んでください

- ✕ ①ICU患者のせん妄発症を予防するために、非定型的抗精神病薬は効果的 **とはいえない**
- ✕ ②早期離床とは、ベッドから離れて行う歩行のことだけでなく、**ベッド上の座位なども含む**
- ③せん妄の発症と持続期間を減少するために可能な場合は早期離床を促した方が良い
- ✕ ④せん妄の種類では、活動型せん妄よりも**低活動型せん妄の方が**多い

PADガイドライン プレ/ポストテスト 解答③

5.次の問題から正しいものを選んでください

- ✕ ①人工呼吸管理中などの成人重症患者に対して、ルーチンで身体抑制を行うべきではない
- ②ICUにおいて患者の睡眠リズムを整えるべきである
- ✕ ③せん妄と不穏は同義ではない
- ✕ ④早期リハビリテーションはせん妄に効果がある